



Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

PUBLICATĂ ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iunie 2024

Data Intrării în vigoare: 05 Iunie 2024

Decizie nr. 11/2CN din 24.05.2024 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul stomatologic

Având în vedere prevederile art. 512 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1 - (1) În vederea asigurării calității actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet stomatologic se va asigura o trusă de urgență.

(2) Conținutul minim al trusei de urgență este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10 din 16 octombrie 2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Florin-Dan-Cezar Lăzărescu

București, 24 mai 2024

Nr. 11/2CN.



Colegiul Medicilor Stomatologi

ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

ANEXĂ

CONȚINUTUL MINIM al trusei de urgență pentru cabinetul stomatologic

I. Aparatură și materiale obligatorii

1.	Tensiometru	1 buc.
2.	Feșe 10x10 cm	3 role
3.	Bandă adezivă 5x5 cm	2 role
4.	Soluție polividon-iodat (betadina, iodină, iodosept, poliiodine) sau clorhexidină (hibiscrub, hibitane, clorhexin, desmanol) pentru tegumente	1 flacon
5.	Seringi 5 ml/ 10 ml sterile	5 buc.

II. Aparatură facultativă:

- butelie de oxigen cu reductor
- balon de resuscitare
- pipă orofaringiană
- pulsoximetru
- branule
- garou
- defibrilator

III. Medicamente obligatorii

Nr.	DCI (denumirile comerciale sunt listate în paranteză)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații
1.	Nitroglicerina (Ex. NITROMINT)	Cpr. 2,6 mg sau	1 cutie	Se administrează 1 cps. sublingual în criză de angina pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAS >100 mg Hg; se poate repeta administrarea la intervale de 5 min (până la 3-4 cps.).



Colegiul Medicilor Stomatologi

R O M Â N I A

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

		Aerosol 0,4 mg/doză	1 flacon (10g)	Se administrează 2 pufuri sublingual în criză de angina pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu Tas >100mg Hg; se poate repeta la 5 min.
--	--	---------------------	----------------	---

2.	Nifedipină (ADALAT, CORDIPIN, CORINFAR, NIFIDIPIN, NIFADIL, NIFELAT)	Cpr. 10 mg	1 cutie (10 cpr.)	Se administrează 1 cps. pentru reducerea TA.
3.	Acid acetilsalicilic (ASPIRINĂ)	Cpr. 500 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. mestecat în cazul suspiciunii de infarct acut miocardic.
4.	Enalapril (ENAP) sau Furosemid (FUROSEMID) sau METOPROLOL (BETALOC)	Cpr. 5 mg 10 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. pentru reducerea TA; la nevoie se mai poate administra 1 cpr.
5.		Cpr. 40 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. pentru reducerea TA.
6.		Cpr. 50 mg	10 buc.	Se administrează 1 cps. pentru reducerea TA.
7.	Adrenalină 1:1000 (EIPEN, EIPEN 300)	stick autoinjector 0,3 mg (aduți)	1 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar.
	Adrenalină 1:2000 (EIPEN JUNIOR, EIPEN 150) *	stick autoinjector 0,15 mg (copii >30kg)	1 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar.

* medicament obligatoriu doar în trusa de urgență din dotarea cabinetelor stomatologice școlare, conform Ordinului comun al MEN/MS nr. 2.508/4.493/2023, pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de



Colegiul Medicilor Stomatologi
ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătoscu modificările și completările ulterioare

8.	Hidrocortizon Hemisuccinat (FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT	flacon 100mg sau fiole 25 mg	10x100mg 40x25mg	Se administrează i.m. în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei de astm bronșic sau al crizei Addisoniene
----	---	--	-----------------------------	--

9.	Levocetirizina(XYZAL) sau Loratadină (CLARITINE) sau Desloratadină (AERIUS) sau Cetirizină (ZYRTEC)	5 mg Cpr. 10 mg Cpr. 5 mg Soluție 10mg/ml	10 cpr. 10 buc. 10 buc. 1 sticlă	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute Se administrează 5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute
10.	Salbutamol (BUVENTOL,SALBUVENT, VENTOLIN)	Spray 100mg/doză	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri în caz de criză de astm bronșic
11.	Glucoză 5%	flacon 500 ml	1 buc.	Se administrează 5-10 ml oral în caz de hipoglicemie.
12.	Carbazocrom (Adrenostazin) sau Etamsilat (Etamsilat) sau Fitomenadiona (Fitomenadiona)	fiole 1,5 mg/5ml fiole 250 mg/2ml fiole 10mg/ml	5 buc. 5 buc. 5 buc.	Se administrează o fiolă i.m., în caz de hemoragie.



Colegiul Medicilor Stomatologi
ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

13.	Ketorolac (KETOROL, KETRODOL, TORADOL) sau Metamizol (ALGOCALMIN, ANALGIN)	Cpr. 10 mg Cpr. 500 mg	10 buc. 10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral ca analgezic.
14.	Drotaverină (NO-SPA)	Cpr. 40 mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral ca analgezic la pacienta însărcinată.
15.	Amoxicilină (OSPAMOX, DUOMOX, E- MOX, EPHAMOX, MOXILEN)**	Cpr. 500 mg	10 buc.	Se administrează 2 g oral pentru antibioprolaxie.
	sau Clindamicină (DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDA, LANACINE)	Cpr. 600 mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral pentru antibioprolaxie.
** NU se administrează pacienților alergici la peniciline !!				

IV. Medicamente facultative:

1.	Adrenalină 1:1000	fiole 1 mg/1 ml	5 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 ml soluție injectabilă nediluată s.c. / intralingual; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TAS > 90 mm Hg).
2.	Diazepam	fiole 10 mg/2 ml	5 buc.	Se administrează 1 fiolă i.m. în caz de criza convulsivă.
3.	Prometazină (ROMERGAN)	fiole 50mg/2ml	5 buc.	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacțiilor alergice acute.



Colegiul Medicilor Stomatologi
ROMÂNIA

Str. Lainici nr. 9, sector 1

Tel: 0725.351.765, 0737.666.308

secretariat@cmsr.ro

cmsr.ro

4.	Alprazolam (Xanax)	Comprimate 0,5 mg	5 buc	Tulburări de panică -0,5 -1 mg alprazolam administrata oral.
----	--------------------	----------------------	-------	--