Publicată în: M. Of. nr. 292 din 3 aprilie 2025

Data intrării in vigoare: **3 aprilie 2025**

DECIZIE

privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul stomatologic*)

***)** *Forma consolidată a Deciziei nr. 2/2CN din 20 martie 2025, prin includerea modificărilor şi completărilor aduse prin Rectificarea nr. 2/2CN din 20 martie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 437 din 13 mai 2025 şi prin Decizia nr. 8/2CN din 19 septembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 892 din 30 septembrie 2025.*

Având în vedere prevederile art. 512 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. — (1) În vederea asigurării calității actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet stomatologic se va asigura o trusă de urgență.

(2) Conținutul minim al trusei de urgență este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 11/2CN/2024 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul stomatologic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 522 din 5 iunie 2024.

Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Florin-Dan-Cezar Lăzărescu

București, 20 martie 2025.

Nr. 2/ 2CN/ 2025

ANEXĂ

CONŢINUTUL MINIM

al trusei de urgenţă pentru cabinetul stomatologic

I. Aparatură şi materiale obligatorii:

1.	Tensiometru	1 buc.
2.	Fețe 10x10 cm	1 rolă
3.	Bandă adezivă 5x5 cm	1 rolă
4.	Seringi 5 ml/ 10 ml sterile	5 buc.

II. Aparatură facultativă:

- balon de resuscitare
- pipă orofaringiană
- pulsoximetru
- termometru
- defibrilator
- glucometru
- branule
- garou

III. Medicamente obligatorii:

Nr	**DCI** (denumire comună internațională)	**Forma farmaceutică**	**Cantitate**	**Observații**	**Prospect disponibill https://nomenclator.anm.ro/medicamente?order=dci&direction=asc**
1	POVIDONUM IODINATUM	Soluție cutanată 100mg/ml	1 flacon		https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_688_01.05.08.pdf
2.	Ser fiziologic	500 ml	1 buc		https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5978_22.11.13.pdf

3.	NITRO GLYCERINUM	Spray sublingual 0,4mg/doză sau Comprimate. sublinguale 0,5mg	1 flacon	Se administrează în criză de angina pectorală, astm cardiac. La debutul unei crize se administrează 1 puf sub limbă, apoi se închide gura înainte de a respira normal. Dacă simptomele persistă, administrarea se poate repeta, fără a depăși 3 pufuri la interval de 5 minute între doze.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12439_25.09.19.pdf
			5 buc.	Se administrează 1 cpr. sublingual în criză de angina pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAs >100 mg Hg. Dacă durerea cardiacă (criza anginoasă) nu cedează, doza poate fi repetată.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9419_27.10.16.pdf
4.	NIFEDIPINUM	30 mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11912_11.06.19.pdf
5.	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	Comprimate gastrorezistente 100mg sau 75mg	5 buc.	Antitrombotice, antiagregante plachetare, administrate conform prospectului, pentru a reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge, împiedicând astfel apariția ulterioară a: infarctului miocardic, accidentelor vasculare cerebrale, problemelor cardiovasculare la pacienții diagnosticați cu angină pectorală stabilă sau instabilă.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_15003_19.05.23.pdf https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_15002_19.05.23.pdf
6.	CAPTOPRILUM sau FUROSEMIDUM	Comprimate 25mg sau 50mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11274_27.12.18.pdf https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11275_27.12.18.pdf
		Comprimate 40 mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale (La vârstnici, furosemida se administrează cu prudență deoarece acestia sunt sensibili	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13808_22.03.21.pdf https://www.anm.ro/_/_PR

	sau METOPROLOLUM			la efectele diuretice și hipotensive ale furosemidei. Pacientii vârstnici prezintă un risc mai mare de aparitie a colapsului sau a tromboemboliei și au funcțiile renale modificate, ceea ce impune ajustarea dozei) .	O/PRO_6602_30.06.14.pdf
		Comprimate/ Comprimate cu eliberare prelungită. 50mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. pentru reducerea tensiunii arteriale	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12449_25.09.19.pdf https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7136_26.11.14.pdf
7.	EPINEPHRINUM sau EPINEPHRINUM	Soluție injectabilă în stilou preumplut 150 µg 300 µg	1 buc. 1 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11529_20.03.19.pdf https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11530_20.03.19.pdf
		Soluție injectabilă 1 mg/ml	3 fiole	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 mg adrenalină (0,3 ml soluție injectabilă nediluată) sc/im; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TAS > 90 mm Hg).	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10171_04.09.17.pdf
8.	HYDRO CORTISONUM	Soluție injectabilă 19,6mg/5ml sau pulbere si solvent pt. solutie injectabilă/ perfuzabilă 100mg	5 buc.	Se administrează i.v. în stări de șoc, edem laringian, insuficienţă respiratorie acută, stare de rău astmatic, edem pulmonar toxic, edem Quincke, comă, encefalită acută, meningită acută, insuficienţă corticosuprarenaliană acută.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13608_21.12.20.pdf
			5 buc.	Poate fi administrat i.v. (cu o seringă sau perfuzie) sau i.m. (cu o seringă).	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_15571_07.08.24.pdf

9.	LEVOCETIRIZINUM Sau LORATADINUM sau DESLORATADINUM sau CETIRIZINUM	Comprimate filmate 5mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute.	https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_2074_20.10.09.pdf
		Comprimate 10mg sau Sirop 1mg/ml	5 buc. 1 sticlă	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute Se administrează 10 ml în cazul reacțiilor alergice acute	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11021_12.10.18.p df https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11020_12.10.18. pdf
		Comprimate filmate 5mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute	https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/reg_hum_act.htm?sort=a
		Picături orale soluție 10mg/ml	1 sticlă	Se administrează 5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute	https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_5076_19.10.12.pdf
10.	SALBUTAMOLUM	Suspensie de inhalat presurizată 100µg/doza	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri în caz de criză de astm bronșic	https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_675_24.04.08.pdf https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9542_21.12.16.pdf
11.	GLUCOSUM	Soluție injectabilă 3,3 g/10ml	3 fiole	Se administrează în caz de hipoglicemie, în injecţii intravenoase lente, în doze care depind de necesităţile individuale ale pacienţului (stare clinică, greutate, alimentaţie, asocieri terapeutice) și de glicemie. Doza nu trebuie să depășească 500 – 800 mg glucoza/kg corp/oră și 500 ml/24 ore.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13733_25.02.21.pdf
12.	CARBAZOCHROMI SALICYLAS sau ETAMSYLA	Soluție injectabilă/ perfuzabilă 1,5mg/5ml	5 fiole	Se administrează o fiolă i.m. în caz de hemoragie	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13065_20.03.20.pdf
		Soluție injectabilă 250mg/2ml	5 fiole		https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12401_30.08.19.pdf

	TUM sau PHYTOMENADIONUM	Soluție injectabilă 10mg/ml	5 fiole		https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9981_22.05.17.pdf
13.	KETOROLACUM TROMETHAMIN (KETOROL) sau METAMIZOLUM NATRIUM	Comprimate filmate 10mg	5 buc.	Se administrează 1 cpr. oral ca analgezic	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7608_30.04.15.pdf
		Comprimate 500mg	5 buc.		https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_14462_24.05.22.pdf
14.	PARACETAMOLUM sau IBUPROFENUM sau METAMIZOLUM NATRIUM	Comprimate 500mg	5 buc.	Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, cu precădere în primele 3 luni și după luna a 5-a. Paracetamolul se poate administra cu precauție în timpul alăptării.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12528_30.09.19.pdf
		Comprimate filmate/ Drajeuri/ Capsule moi 200 mg	5 buc	Nu este recomandat în primele 3 luni de sarcină. Este contraindicat în timpul ultimelor 4 luni de sarcină. Se recomandă, ca o măsură de precauție, să se evite administrarea la mamele care alăptează.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7161_27.11.14.pdf
		Comprimate/ Comprimate filmate 500mg	5 buc	Dozele unice de metamizol pot fi acceptate între luna a 3-a și a 6-a, după ce beneficiile și riscurile utilizării metamizolului au fost evaluate cu atenție. Nu se administreaza metamizol în ultimele 3 luni de sarcină din cauza unui risc crescut de complicații pentru mamă și făt. În perioada alăptării, în cazul unei singure administrări de metamizol, mamele sunt sfătuite să colecteze și să arunce laptele matern timp de 48 de ore după administrarea dozei.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10965_11.09.18.pdf

IV. Medicamente facultative:

Nr	DCI (denumire comună internațională)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații	Prospect disponibill
1.	*Abrogat*				
2.	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM	Soluție injectabilă 50 mg/ml	5 fiole	Hipotensiune arterială: Efedrina se administrează în doza recomandată de 10-50 mg intramuscular sau subcutanat sau 5-25 mg lent intravenos repetând la nevoie până la 50 mg intramuscular sau 25 mg intravenos Doza zilnică administrată parenteral la adulţi nu trebuie să depăşească 150 mg.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12497_30.09.19.pdf
3.	ATROPINUM	Soluție injectabilă 1 mg/ml	5 fiole	Bloc atrio-ventricular. Infarct miocardic acut, pentru prevenirea şi tratamentul blocului atrioventricular şi al bradicardiei sinusale. Resuscitare cardiopulmonară, pentru tratamentul bradicardiei sinusale. Bolus 0,1mg la 10 kg.	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6061_23.12.13.pdf
4.	DIAZEPAMUM	Soluție injectabilă 5mg/ml	3 fiole	Se administrează 1 fiolă i.m. în caz de criza convulsivă	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9509_13.12.16.pdf
5.	DIPHENHYDRAMINUM	Soluție injectabilă Concentratia 30mg/2ml	3 fiole	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacţiilor alergice acute	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13919_27.05.21.pdf
6.	OXIGENUM	Gaz medicinal comprimat 100% (v/v)			https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_14798_28.11.22.pdf
7.	AMOXICILLINUM * Sau CLARITHROMYCINUM	Comprimate 500mg	10 buc.	Se administrează 2g oral pentru antibioprofilaxie	https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_5474_27.03.13.pdf
		Comprimate 500mg	10 buc.	Se administrează 1 cpr. oral pentru antibioprofilaxie	https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10696_13.04.18.pdf
**** NU se administrează pacienților alergici la peniciline !***					
